

Priedas nr. 3.**Mirtys ir jų priežastys**

Metai	Mirė žmonių	Metai	Mirė žmonių	Metai	Mirė žmonių
1849	128*	1857	154	1865	157
1850	163	1858	199	1866	175
1851	103	1859	158	1867	145
1852	119	1860	119	1868	263***
1853	108	1861	139	1869	328****
1854	113	1862	176	1870	107
1855	140	1863	135		
1856	157**	1864	127		

* Nuo dizenterijos epidemijos mirė 58 žmonės (22,56% mirusiųjų).

** Sautė kokliušo epidemija, nuo jos mirė 26 vaikai ir viena 30 metų amžiaus moteris (17, 2 % mirusiųjų).

*** Nuo krupo epidemijos mirė 51 žmogus (19, 4 % mirusiųjų).

**** Sautė tymai, nusinešę 47 gyvybes ir karštinė, nuo kurios mirė 161 žmogus (iš viso 49 % proc. mirusiųjų).

Mirties priežastys														
Metai	Iš viso mirė	Tarp jų vaikų	Karštinė	Džiova	Kosulys	Kokliušas	Dizenterija	Krupas	Senatvė	Raupai	Cholera	Tymai	Auglys	Gimdymo komplikacijos
1850	164	80	10	37	20		58		12					
1851	107	36	11	39	11				17					
1852	119	27	23	29	18				24	3	2			
1853	108	22	15	22	19		4		28	2				
1854	113	44	10	17	2	9			10		1		3	1
1855	140	44	31	19	4	6	2		21		11			
1856	157	68	17	28	9	26	2		24				3	

1857	154	67	18	42	19	5			26				10	
1858	99	34	11	8		1	2		7	2		32	2	
1859	158	45	15	19	2	1	1	1	21	45			2	
1860	110	43	16	28	8		2	1	16					
1861	139	69	13	21	3	18	1		23			2		2
1862	176	52	14	27	4	16		17	24			1	4	2
1863	135	33	17	20		6	1	32	19	1		23	1	
1864	127	50	22	40		2		3	8	14				2
1865	157	57	13	28	5	1		8	16	9			4	3
1866	175	58	21	22		6		33	18	3			2	8
1867	145	50	27	22	129			22	16			12		5
1868	263	103	30	35	3			51	24	29		8	4	3
1869	328	56	161	20	8				6			47	2	2
1870	107	38	17	29				11	13				1	1
Viso	3181	1076	512	552	264	97	73	179	373	108	14	125	38	29
%		33,82	16,09	17,35	8,29	3,05	2, 29	5, 62	11,72	3,4	0,44	3,93	1,2	0,91
Pastaba: 1858 m. mirties faktai registruoti iki 1858 m. birželio 1 d.														

Vaikų šeimose gimdavo daug, tačiau didelę jų dalį anksti nusinešdavo mirtis. Iki vienerių metų amžiaus vaikų mirties priežastis dažniausiai nurodoma silpnumas.

Palyginti daug žmonių, tiek vaikų, tiek suaugusiųjų, mirdavo nuo tuberkuliozės. 1851 m. dėl šios ligos mirė 36,5%, 1852 m. – 24,4%, 1853 m. – 20, 37%, 1857 m. – 27,2%. 1870 m. – 27,1% visų mirusiųjų. Nuo senatvės kasmet mirdavo 10–12 % žmonių.